

PERINEOPLASTIE

Wat is het?

De perineoplastie is een minimale chirurgische ingreep om de ingang van de vagina te versmallen of verbreden, omwille van esthetische of functionele indicaties.

Deze behandeling is geschikt voor jou als je na de bevalling pijn ervaart bij seksuele betrekkingen, je vagina in de menopauze te smal is geworden, je te losse weefsels hebt waardoor je een verminderd gevoel hebt bij seksuele betrekkingen.

Stap 1: Intakegesprek

Voor de behandeling bespreken we uw wensen. We bekijken de probleemzones en het gewenste resultaat. Dr. Marijke Aerts schetst een volledig beeld van de mogelijkheden en eventuele risico's. Als we van mening zijn dat de behandeling niet de juiste is om het gewenste resultaat te bereiken, stellen we een andere behandeling voor die beter geschikt is.

Stap 2: Voorzorg

U scheert 24u op voorhand de intieme zone.

Ondergaat u de ingreep onder lokale verdoving, dient u sowieso te ontbijten.

Stap 3: Behandeling

Ter hoogte van de vulva brengen we een crème of spray aan voor plaatselijke verdoving. Bij het begin van de ingreep injecteren we nog een lokale verdoving.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. Na de chirurgische correctie wordt de huid gesloten met resorbeerbare hechtingen die deels verwijderd dienen te worden.

Het is na de ingreep aangeraden om niet zelf met de auto te rijden.

Stap 4: Nazorg

Een goede nazorg is belangrijk:

- Na de behandeling zal er een zwelling optreden, hiervoor adviseren we de eerste 48u lokale ijsapplicatie (ingevroren erwtes)
- U gebruikt minstens 3x per dag lokaal flimirins spray, ter bevordering van de wondheling
- Zitten op een opgerolde handdoek om tegendruk te geven is zinvol (gebruik zeker geen zwemband!)
- Inname van Ibuprofen Forte 600, 4x per dag gedurende 4 dagen, indien nodig afwisselend met Paracetamol 1g
- Het gebruik van een inlegkruisje met homeoplasmine erop is aan te raden, zo plakt de wonde niet in het verband

Zwelling, minimaal bloedverlies, roodheid en drukgevoeligheid zijn te verwachte post-operatieve klachten. Na 1 week zouden deze symptomen allemaal moeten verbeterd zijn.

Eén week na de ingreep worden de hechtingen gedeeltelijk verwijderd tijdens de eerste postoperatieve controle.

Gedurende 4 weken mag u geen seksuele betrekkingen hebben, geen sauna of warm bad nemen, niet paardrijden en fietsen.

Bij hevige pijn, veel bloedverlies of koorts dient u de kliniek te contacteren: Dr.aerts@gynaecoplus.be

Stap 5: Nacontrole

We plannen een controle in 1 week na de ingreep.

Resultaat

Het resultaat is zichtbaar na één week. Na 6 weken zijn de resultaten goed en na 3 maanden volledig.

LET OP: Deze behandeling is niet geschikt voor zwangere vrouwen, diabetici, bepaalde auto-immuunziektes, acute vaginaal infecties (herpes is een echte contra-indicatie) en stollingsstoornissen.

Patiënten die roken of een ongezonde levensstijl hebben zullen een minder goed resultaat bekomen.